Apteka Przyjazna
ul. Cieszkowskiego 5/7, Swarzędz
+48 61 818 50 69

Anaftin Mouthwash, płyn do płukania jamy ustnej na afty, 120 ml

Cena: 29,98 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	120 ml
Postać	-
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Anaftin Płyn do płukania jamy ustnej
Postać: płyn do pł.j.ust.
Dawka: -
Opakowanie: 120 ml
Skład: Poliwinylopirolidon (PVP), maltodekstryna, glikol propylenowy, aloes zwyczajny (Aloe barbadensis), hydroksyetyloceluloza, sorbinian potasu, benzoesan sodu, PEG-40 olej rycynowy uwodorniony, wersenian disodu (EDTA), chlorek benzalkonium, hialuronian sodu, aromat, sacharynian sodu, dwupotasowa sól kwasu glicyryzynowego, woda.
Działanie: Anaftin® Płyn do płukania jamy ustnej zawiera poliwinylopirolidon (PVP) i kwas hialuronowy, które tworzą ochronną warstwę pokrywającą jamę ustną, stanowiącą barierę mechaniczną dla uszkodzonych okolic, i dzięki temu łagodzi ból wywołany podrażnieniem odsłoniętych zakończeń nerwowych. Zawarte w składzie kwas hialuronowy i aloes wspomagają naturalny proces gojenia uszkodzonych tkanek.
Wskazania: Anaftin® Płyn do płukania jamy ustnej łagodzi dolegliwości bólowe wywołane niewielkimi zmianami w jamie ustnej, takimi jak: aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe, jak również uszkodzenia spowodowane aparatami ortodontycznymi lub źle dopasowanymi protezami. Jest również wskazany do stosowania w przypadku rozległych owrzodzeń aftowych.
Przeciwwskazania: Stosowanie produktu Anaftin® Płyn do płukania jamy ustnej jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników.
Dawkowanie: Wypełnij załączoną nakrętkę z miarką do linii 10 ml. Płucz jamę ustną przez co najmniej 1 minutę, następnie wypluj płyn. Stosuj 3–4 razy dziennie lub w razie potrzeby. Dla uzyskania najlepszych rezultatów nie należy jeść ani pić przez co najmniej 1 godzinę po zastosowaniu płynu. W razie przypadkowego połknięcia płynu nie są wymagane żadne dodatkowe działania.
Dawkowanie (dorośli): Wypełnij załączoną nakrętkę z miarką do linii 10 ml. Płucz jamę ustną przez co najmniej 1 minutę, następnie wypluj płyn. Stosuj 3–4 razy dziennie lub w razie potrzeby. Dla uzyskania najlepszych rezultatów nie należy jeść ani pić przez co najmniej 1 godzinę po zastosowaniu płynu. W razie przypadkowego połknięcia płynu nie są wymagane żadne dodatkowe działania.
Dawkowanie (dzieci): Wypełnij załączoną nakrętkę z miarką do linii 10 ml. Płucz jamę ustną przez co najmniej 1 minutę, następnie wypluj płyn. Stosuj 3–4 razy dziennie lub w razie potrzeby. Dla uzyskania najlepszych rezultatów nie należy jeść ani pić przez co najmniej 1 godzinę po zastosowaniu płynu. W razie przypadkowego połknięcia płynu nie są wymagane żadne dodatkowe działania.

Odtrutki: W razie przypadkowego połknięcia płynu nie są wymagane żadne dodatkowe działania.
Środki ostrożności: Nie stosować po upływie terminu ważności lub w przypadku uszkodzenia lub nieszczelności butelki. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródła ciepła. Nie zamrażać.
Ciąża: W przypadku ciąży przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.
Uwagi: W przypadku częstych nawrotów owrzodzeń jamy ustnej wskazana jest konsultacja lekarska.